

သိရှိရန် အချက်အလက်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါက ဘေးကင်းစွာနေထိုင်ပါ။
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။



သင်သည် နောက်ဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး နှစ်ပါတ်ကြာသည် အထိ COVID-19 ရောဂါမှ အပြည့်အဝ မကာကွယ်ပါ။



- သင်သည် ကာကွယ်ဆေး နှစ်ကြိမ်ထိုးပြီးပါက ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီး 2 ပါတ် ပြည့်အောင် မဖြစ်မနေ စောင့်ရပါမည်။
- သင်သည် တစ်ကြိမ်သာထိုးရန်လိုသည့် ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးထားပါက ဆေးထိုးပြီးနောက် 2 ပါတ် ပြည့်အောင် မဖြစ်မနေစောင့်ရပါမည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပါက ဘေးကင်းစွာနေထိုင်ပါ။

ကာကွယ်ဆေးသည် သင့်အား COVID-19 ရောဂါမှ မည်မျှကြာ ကာကွယ်ပေးမည် သို့မဟုတ် သင်သည် ဆေးထိုးပြီးနောက် အခြားသူများထံ COVID-19 ဖြန့်ဝေနိုင်သည်ကို ပညာရှင်များအနေနှင့် မသိပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသည့်တိုင် ဆက်လက်ပြီး



နာခေါင်းစည်းတပ်ပါ။



လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခွာနေခြင်း (social distancing) ကို လေ့ကျင့်ပါ။



လူစုလူဝေး လုပ်ခြင်းများကို ရှောင် ကျဉ်ပါ။



သင့် လက်များကို မကြာခဏဆေးကြောပါ။



ထိတွေ့မှုများသော ရေိယာများကို ပိုးသတ် သန့်စင်ပါ။

သင်သည် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်ထိုးပြီးသည့်တိုင်အောင် COVID-19 ပိုး ရှိမရှိ အစစ်ဆေးခံပါ။



အကယ်၍ သင်သည် COVID-19 ပိုးရှိသော တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် အတူရှိနေခဲ့ပြီး နေထိုင်မကောင်း စတင်ခံစားရလျှင် ထို့အပြင် အိမ်တွင်လည်းနေပါ။ အခြားသူများနှင့် ခွာနေပါ။

အကယ်၍ သင်သည် လူများစွာနှင့် အတူနေပြီး COVID-19 ပိုးရှိသော တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် အတူရှိနေခဲ့လျှင် ဖျားနာခြင်း မခံစားရသည့် တိုင်အောင် ပိုးရှိ၊ မရှိ အစစ်ဆေးခံပါ။ ထို့အပြင် အိမ်တွင်လည်းနေပါ။ အခြားသူများနှင့် ခွာနေပါ။



refugees
NORTHWEST

A PROGRAM OF
Lutheran Community Services Northwest

ကာကွယ်ဆေးအပြည့် ထိုးပြီး နောက် နှစ်ပါတ်တွင် သင်သည်



ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးထားပြီးသော အခြား လူများနှင့် နှာခေါင်းစည်းမတပ်ဘဲ အခန်းတွင်း နေထိုင်နိုင်ပါသည်။



ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသော အခြား အိမ်မှ တစ်ဦးစီ နှင့်အတူ နှာခေါင်းစည်းမတပ်ဘဲ အတူနေ နိုင်ပါသည်။



သို့သော် သင်သည် COVID-19 ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ဖျားနာနိုင်ခြေရှိသော လူများအား အကာအကွယ်ပေးရန် ထိုသူတို့နှင့် ဝေးရာတွင်

နေထိုင်ပါ။ ထိုသူတို့နှင့် တွေ့ရမည်ဆိုပါက သူတို့ကို ကာကွယ် ရန်အတွက် နှာခေါင်းစည်းတပ်ပါ။ 6 ပေအကွာတွင်နေပါ။ သင့်လက်ကိုဆေးပါ။

အပြင်းဖျားခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေများသူများမှာ-

- ကင်ဆာ၊ ဆီးချို သို့မဟုတ် သွေးတိုးကဲ့သို့ အခြားသော ရောဂါအခံ ရှိထားသူများဖြစ်သည်။
- ကိုယ်အလေးချိန် အဆမတန်များသည်
- ဆေးလိပ်သောက်သည်
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသည်
- အသက် 65နှစ် အထက်

ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက် လေ့လာနေဆဲဖြစ်သည်။



- ကာကွယ်ဆေးများသည် ဆေးထိုးထားသူများကို COVID-19 ဖြစ်ခြင်းမှ မည်မျှကြာအောင် ကာကွယ်ပေးသနည်း။
- ကာကွယ်ဆေးများက ရောဂါပြန့်ပွားခြင်းကို တားဆီးပေးပါ သလား။
- ကာကွယ်ဆေးများသည် COVID-19 အမျိုးအစားသစ်များ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။

ခရီးသွားနေစဉ် ဘေးကင်းလုံခြုံပါစေ။



ခရီးသွားတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင်နဲ့ တခြားသူများကို ကာကွယ်ရန် -

- သင့်နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကို မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများကို ကာကွယ်ပါ။
- လူအုပ်များကို ရှောင်ခြင်းနှင့် သင် ခရီးအတူသွားလာခဲ့ ခြင်း မရှိသောသူများနှင့် အနည်းဆုံး 6 ပေ/2 မီတာ အကွာ တွင်နေပါ။
- မကြာခဏလက်ဆေးခြင်း။



United States အတွင်း ခရီးသွားနေ စဉ် ဘေးကင်းလုံခြုံပါစေ။

- ခရီးမသွားမီ ပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးခံရန် မလိုအပ်ပါ။
- သင်ပြန်ရောက်လာသောအခါ ဖျားနာခြင်းမရှိပါက ပိုး စစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသူများနှင့် အဝေးတွင်နေခြင်း ပြုလုပ်ရန် မလိုပါ။



နိုင်ငံတကာသို့ ခရီးသွားပါက ဘေး ကင်းအောင်နေထိုင်ပါ။

- သင့်ခရီးစဉ်မတိုင်မီတွင် ပိုးစစ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားလူ များနှင့် ဝေးရာတွင်နေခြင်း ပြုလုပ်ရန် လိုမလိုကို သင့် လေကြောင်းလိုင်း၊ သင်သွားမည့်နေရာရှိ ကျန်းမာရေး အရာရှိများနှင့် စုံစမ်းပါ။
- U.S. သို့ပြန်မလာမီ 3 ရက်အတွင်း ပိုးစစ်ပါ။
- သင့်ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါ-
 - 3-5 ရက်အတွင်း ပိုးစစ်ပါ။
 - သင်ဖျားနာပါက အိမ်တွင်နေပြီး အခြားသူများနှင့် ဝေး ရာတွင်နေပါ။
 - အခြားလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်များအတွက် သင်၏ ဒေသတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးအရာရှိများထံတွင် စုံစမ်းပါ။



refugees
NORTHWEST

A PROGRAM OF
Lutheran Community Services Northwest