

သိရှိရန် အချက်အလက်များ

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ရုခါဂါကူးစက်ခြင်း (BREAKTHROUGH INFECTIONS)

COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ အများစုမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူများဖြစ်သည်

"ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် COVID-19 ကူးစက်ခံရခြင်းမှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲပါ။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။" သိပ္ပံပညာရှင်များက "ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ရုခါဂါကူးစက်ခြင်း (Breakthrough infections)" ဟုခေါ်ကြပါသည်။



ကာကွယ်ဆေးများသည် အပိုင်းအထန်ဖျားနာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ရုခါဂါပိုးကူးစက်နှုန်း အဆမတန် မမြင့်မားခြင်းများ ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ကာကွယ်ဆေးများသည် ဆေးထိုးထားသူအားလုံးကို အပိုင်းအထန် ဖျားနာခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။



COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ဘေးကင်းလုံခြုံပါသည်

ကာကွယ်ဆေးသည် ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းကို အမျိုးမျိုးသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်နှင့် သန်း ရာချီသော လူများတွင် သက်သေပြထားပါသည်။ အပျော့စား ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ပြင်းထန် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် အင်မတန်ရှားပါးပြီးဖြစ်ပွားသူအများစုမှာလည်း ပြန်လည်သက်သာကြပါသည်။

COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများသည် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါသည်။

သင့်ကိုယ်သင်၊ သင့်မိသားစုနှင့် သင့်လူမှုဝန်းကျင်ကို Delta မျိုးကွဲမှ ကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ကာကွယ်ဆေးအပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သင်သည် ကာကွယ်ဆေး အပ်နှံခြင်းပိုမိုပြုကာ COVID-19 ကူးစက်မခံနိုင်ပါ။ အခြားသူများထံသို့ ရုခါဂါမပျံ့နှံ့နိုင်ပါ။



သင်သည် ကာကွယ်ဆိုးထိုးပြီးနောက် ရုခါဂါကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးထိုးပြီးသည့်တိုင်အောင် နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ပါက သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်မိသားစုသည် ဘေးကင်းအလုံခြုံခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

လူအများနှင့် ခပ်ခာခွာနေခြင်း (social distancing)၊ လူစုလူဝေးလှုပ်ခြင်းများကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းနှင့် လက် မကပ်ခြင်းကလေးများသည် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစေသည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။

သင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။



refugees NORTHWEST
A PROGRAM OF Lutheran Community Services Northwest